

Памятка носит рекомендательный характер, составлена на основании рекомендаций ветеринаров и опыта хозяев, заболевших животных.

Обязательным условием борьбы с микроспорией котов является **дезинфекция**:

1. Помещения. Ежедневная уборка квартиры. Во время первых уборок используется пылесос. Пылесосить нужно всё: пол, мебель, кресла и диваны, клетку кошки. Потому что переносчиками спор грибов могут быть шерстинки и чешуйки, которые активно начинают отделяться в начале лечения и могут разлетаться по всему дому. Пылесосить лучше с одноразовыми пылесборниками, которые впоследствии рекомендуется сжечь. Если одноразовые пакеты отсутствуют, можно использовать многоразовый пакет. Однако освобождение от содержимого должно быть произведено в месте, исключающем распространение пыли с обязательной последующей дезинфекцией пылесборника. Или возможна дезинфекция пакета вместе с содержимым, а потом очистка пакета, и повторная дезинфекция чистого пакета. Используйте 2% раствор, выдержка – минимум 30 мин.

После пылесоса – влажная уборка. Протирание мебели, стульев, столов ветошью, смоченной в дез.растворе и мытье пола (0,5 - 1 %) и распыление дез.средства на не предназначенные для протирания поверхности: диваны, кресла, ковровые покрытия и другие (1,5% раствор).

2. Подстилка, место содержания. Подстилка дезинфицируется в дез.растворе путем замачивания (2% раствор). Место содержания опрыскивается (1,5% раствор, дать высохнуть). После опрыскивания не смывать для пролонгированного действия.

3. Одежда (если кот любит прятаться в шкафу), покрывала с диванов и постельное белье. Дезинфекция в растворе путем замачивания с последующей стиркой и полосканием. (1,5% -2%) раствор. Обязательно почитать пункт 3.8. инструкции (стр.5).

Для экономии: то, что можно прокипятить, кипятите - дезинфицировать необязательно.

4. Отдельное внимание уделите углам, где животное любит прятаться и отдыхать.

5. Руки после контакта мыть тщательно с хозяйственным мылом, можно использовать дезинфицирующие салфетки «Дезавид».

Максимальная рекомендуемая при трихофитиях концентрация 2%. Однако для подстилки и в особо тяжёлых случаях (много котов, невозможность изолировать животное, детей) можно увеличить дозировку до 4%.

Средство обладает низкой степенью токсичности. Тем не менее, при таком объеме обработки обязательно проводить дезинфекцию в перчатках и проветривать помещение.

Таблица приготовления растворов на странице 4 инструкции.

Меры предосторожности - ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ – пункт инструкции.